

世界鱼类知识百科全书

目 录

- 01: 脂鲤科
- 02: 攀鲈科
- 03: 丽鱼科
- 04: 鲤科及美鲇科
- 05: 彩虹鱼族
- 06: 花鳉科
- 07: 花鳉科
- 08: 花鳉科—进口孔雀鱼
- 09: 花鳉科—日本产孔雀鱼
- 10: 花鳉科
- 11: 花鳉科
- 12: 花鳉科
- 13: 鲇科
- 14: 鲇科
- 15: 鲇科
- 16: 鲇科
- 17: 古代鱼及大型鱼
- 18: 古代鱼及大型鱼

脂鲤科

红绿灯(日光灯)鱼

Paracheirodon innesi

它的知名度不亚于神仙鱼,也是具代表性的热带鱼品种。这种鱼只有数十尾群养在一起才最能展示魅力,也是一种适合初学者饲养的品种。



宝莲灯(新红莲)鱼

Paracheirodon axelrodi

在水族店里常可见到这种鱼,而且全部是原产地的野生品种。也许只有亚马孙河的辽阔和广大,才能赋予它如此出众的美丽。



红尾扯旗鱼

Hyphessobrycon robertsi

雄鱼发情时全身能变得鲜红,也是脂鲤科热带鱼中最漂亮的品种之一。如果进口过程中保护得好,属于比较好养的鱼种。



哥伦比亚红鳍扯旗鱼

学名不详

这是最近发现的一个鱼种,体色红蓝相间,十分美丽大方。长大后身体逐渐变宽,拥有令人陶醉的美丽动感。



红头剪刀鱼

Hemigrammus breheri

饲养好的话头部能变得通红,是一种美丽的脂鲤科鱼种。若数十尾群养在一起,再衬以水草的绿色,在水族箱中极为夺目。

红绿灯(日光灯)鱼*Paracheirodon innesi*

这种鱼和孔雀鱼一样同属最常见的热带鱼。价格便宜。饲养容易且体态美观是它的三大优点。尽管它不挑食。饲养简单。但繁殖却不大容易。最好同时饲养十几尾。这样一起游动时更好看。

分布	亚马孙河	身长	3cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**宝莲灯(新红莲)鱼***Paracheirodon axelrodi*

这是一种从南美及欧洲大量进口的常见鱼类。体态与红绿灯鱼相似。但体型稍大。体表红色部分较多。可把它看作高档的红绿灯鱼。

分布	巴西内格罗河	身长	5cm
水质	弱酸性—中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**蓝灯鱼***Paracheirodon simulans*

由于这种鱼体表的红色部分较短而淡。蓝色部分更显突出。因而得名。而且体侧蓝线比霓虹灯鱼更长。也称做长线霓虹灯鱼。

分布	巴西内格罗河	身长	2.5cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**闪光灯(红间)鱼***Hemigrammus erythrozonus*

这种产自东南亚的养殖品种早就相当有名。性格温和。不易得病且容易饲养。极受初学者好评。若成群游动时体侧的红线十分美观。

分布	圭亚那	身长	3cm
水质	弱酸性—中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



Characin

脂鲤科

STAGE 2

以灯类热带鱼为代表的脂鲤科种类非常多，主要分布在南美及非洲地区，其中的小型种类称为“灯鱼”，是享有盛誉的观赏鱼类。

购买和饲养都十分方便， 成群观赏更添情趣



灯鱼是为人熟知的脂鲤科鱼类，种类很多，饲养历史也相当悠久。

脂鲤科热带鱼形态各异，从体长不足5厘米的霓虹灯鱼等小型种类，到科罗摩鱼等体长超过1米的大型鱼应有尽有。

尤其引人注意的是，以吃人著称的食人鲳也是脂鲤科鱼类之一。但实际上除了它们成群扑食的那一刻，平时胆子却很小。

前面说过，这些鱼作为观赏鱼饲养的历史都很久，许多种类在东南亚一带已被广泛养殖，所以无论何时去水族店，总能买到喜欢的脂鲤科鱼种。可以说购买和饲



臭名远扬的食人鲳本性却极胆小。

养方便是这种鱼长盛不衰的主要原因。

此外，正因为脂鲤科鱼种类繁多，除了广为人知的鱼名外，还有许多珍稀品种，收集和饲养这些罕见的鱼种也是不少爱好者津津乐道的事情。尤其是灯类鱼种类繁杂，其中的珍稀种类极富收藏价值。



漂亮且容易饲养的宝莲灯(新红莲)鱼。

P O I N T

要 点

10只以上灯鱼易群养，所以一次购入时最好在10只以上。这种鱼极易在铺满水草的水族箱中生存。



黑日光灯鱼

Hyphessobrycon herbertaxelrodi

黑白日光灯鱼是较常见的一种灯类热带鱼。在日本饲养历史很久，每年从东南亚进口大量养殖品种，因而较容易买到。这种鱼对水质的适应性较强，喂什么饵料都可以，极适合初学者饲养。

分布	巴西	身长	3cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



宝莲灯鱼

Hyphessobrycon ocellifer

眼睛和尾根部发光，体侧的金色斑点十分醒目，属小型脂鲤科热带鱼。身体很宽，显得个头较大。许多尾一起游动时非常好看。不易患病，初学者饲养完全没有问题。

分布	亚马孙河	身长	5cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



尾灯(彩丽灯、小三角灯)鱼

Hemigrammus pulcher

与红目银屏鱼体形极为相似，但尾根黑色部分较大些，以此可以区别。两者的其他特性也基本一样，属于容易饲养的品种。

分布	亚马孙河	身长	5cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



红鳍扯旗鱼

Hyphessobrycon robertsi

不少人认为是灯类热带鱼中最美的品种，平时并无多少引人之处，但一到繁殖期雄鱼体表可出现极艳丽的粉红色，让人刮目相看。

分布	亚马孙河	身长	5cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

柠檬灯鱼*Hyphessobrycon pulchripinnis*

淡黄的体色极像柠檬果,是一种很具魅力的小型脂鲤科鱼类。很早就相当知名,在东南亚一带广为养殖。适应性强,容易饲养。

分布	亚马孙河	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**黑旗鱼***Megalamphodus megalopterus*

随着近年盛行在水族箱中布置水草,喜欢饲养这种鱼的人也逐渐增多。实际上它的外观和体色也的确不乏魅力。由于大量进口产于东南亚的人工繁殖品种,价格已相当便宜。

分布	巴西	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**帝王灯鱼***Nematobrycon pulmeri*

尾鳍伸展开来极像七弦琴,是一种十分漂亮的脂鲤科鱼。如饲养得好,体侧的蓝线会十分显眼。几年前售价不菲,这几年随着养殖数量增多,价格已有所下降。

分布	哥伦比亚	身长	5cm
水质	弱酸性~中性	水温	22~25℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**蓝彩凯利***Inpaichthys kerri*

体侧能随着光线的变化发出蓝光,是一种最美丽的脂鲤科鱼类。水族店销售的多为东南亚的人工繁殖品种,结实易养,但性情稍暴。

分布	亚马孙河	身长	5cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难





企鹅鱼

Thayeria boehlkei

该鱼因体色和头部上仰的姿态极似企鹅，很早以来就相当知名。养大后性情稍显暴躁，每年从东南亚一带大量进口养殖品种。

分布	亚马孙河	身长	5cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



玻璃拉拉

Hasemania nana

原称银鳍脂鲤，是一种饲养历史极久的小型脂鲤科鱼类。每年从东南亚进口大量养殖品种，因而很容易买到。性情非常温顺，且不挑剔饲料。

分布	巴西	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



红头剪刀鱼

Hemigrammus bleheri

饲养状况好时，整个头部像充血似的显出红色，在水草中游动时像一根带火的箭头掠过。如饲养得不好则显不出红色，是一种需下点功夫饲养的热带鱼。

分布	亚马孙河	身长	5cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



银屏灯鱼

Moenkhausia sanctaefilomenae

属非常一般的脂鲤科品种，由于近年养殖品种大量进口，价格极便宜。这种鱼性情活泼，喜欢游动，十分可爱。但有时性情较暴躁。

分布	亚马孙河	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

龙头灯鱼

Gnathocharax steindachneri

这是一种下颚突出,头型极像龙鱼的小型脂鲤科鱼类。这种鱼原先十分罕见,近年已有少量进口,样子虽凶,实际上性情十分温顺。

分布	亚马孙河	身长	7cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



刀身银燕

Gasteropelecus marthae marthae

这是一种体形极像厨刀的一种小型脂鲤科鱼类,很早以来就很有名。这种鱼喜欢在水面附近游动,受惊时可高高跃起,比较容易饲养,但要注意防止跳出水族箱。

分布	亚马孙河	身长	6cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



云石燕

Gasteropelecus strigata strigata

这是与上图的刀身银燕齐名的一种燕鱼,体侧的云石纹十分美丽。和其他银燕类一样,每年因进口数量较多,极易买到。

分布	圭亚那、秘鲁	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



黑线铅笔鱼(红肚铅笔)

Nannosomus beckfordi

这是铅笔类热带鱼中最常见的一种,由于从南美及东南亚大量进口,极易购到。如精心饲养,可以养得像图中那样美丽。

分布	圭亚那、亚马孙河	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难





五点铅笔鱼

Nannostomus espei

这是一种知名度很高的铅笔类热带鱼,其特征为体侧分布有排列极为规则的竖条,因进口数量有限,不易买到。这种鱼饲养较简单,不挑饵食。

分布	圭亚那	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



刚果扯旗鱼

Phenacogrammus interruptus

这是非洲产脂鲤科热带鱼中常见的一个品种,体形比南美小型脂鲤科鱼类略大,体侧有发光的鳞片,长大后十分显眼,性情温和,可与其他品种混养,饲养也较为简单。

分布	中非	身长	10cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



黄金灯鱼

Ladigesia roloffi

这是一种产自西非的小型脂鲤科鱼,气质极佳,配以水草布景十分协调。适宜养在弱酸性水质中。

分布	西非	身长	2cm
水质	弱酸性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



波威利小点鲫

Neolebias powelli

在非洲产脂鲤科热带鱼里属体形较小的品种,在橙红色体表上夹有绿色斑点,斑点数可在一至三个之间变动。

分布	尼日利亚	身长	2.5cm
水质	弱酸性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

粗鳞红尾脂鲤*Chalceus macrolepidotus*

是一种早就十分著名的大型脂鲤科鱼。银色体表上覆盖着粗大的鳞片，鳍及尾呈红色，十分美丽。游动迅速，有时能跳出水族箱。同种鱼之间常有小争斗。

分布	圭亚那、亚马孙河	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**大头鬼鱼***Hydrolycus scomberoides*

是一种张开大嘴能露出满口尖牙的大型脂鲤科热带鱼。样子十分可怕，但性情却极温和，一般不会攻击其他鱼，属肉食性品种，能捕食小鱼，可用金鱼等活饵喂食。

分布	亚马孙河、巴拉圭河	身长	50cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**食人鲳***Pygocentrus nattereri*

亚马孙流域的鲳类热带鱼素以食人鱼著称，这是其中最常见的一种。幼鱼在东南亚繁殖后进口，虽然和其他热带鱼一样摆在水族店出售，可千万不能忘记它的危险本性。

分布	亚马孙河	身长	20cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**短嘴皇冠六间鱼***Distichodus sexfasciatus*

这是一种漂亮的大型脂鲤科鱼类，橙色体表上夹有黑色竖纹。此鱼寿命极长，曾创水族箱养殖的长寿记录。性情凶猛，喜啃食水草，在选择混养品种时应小心，但饲养较容易。

分布	刚果河、安哥拉	身长	45cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



攀鲈科

暹罗斗鱼

Betta splendens var

暹罗斗鱼主要特征为鲜丽的体色和宽大的鳍,是一种著名的热带鱼品种。雄鱼之间的争斗十分残酷,直到咬死对方为止。所以只能一对对分开饲养,或单独与其他品种混养。



三星曼龙鱼

Trichogaster trichopterus

特征为侧面可见三个圆斑(体表两处加上眼圈),每年从东南亚大量进口人工养殖品种。



加里曼丹斗鱼

Bata taeniata

这是一种最近新进口的口孵鱼型斗鱼品种,繁殖比产卵后由雄鱼含在口中孵化,让人充分体味到饲养趣。



苏门答腊红斗鱼

Batta coccinea



苏门答腊斗鱼

Bata fusca

Labvrinth Fish

攀鲈科

STAGE

饲养热带鱼的乐趣之一，在于可以观察这些鱼日常的生活习性。从这个角度来衡量，攀鲈科正是颇具魅力的极好对象。尤其是它们的繁殖过程十分有趣，要饲养它们就要有让它们繁殖的打算。

关注繁殖过程，体味饲养乐趣。



属攀鲈亚目。这类热带鱼最大的特点是能在缺氧环境中生存。因为它们附有一个称为褶鳃的呼吸辅助器官，也就是说它们可以直接将空气吸入口中获取氧气，故有人也称它们为褶鳃族鱼类。

攀鲈科鱼类的繁殖习性也相当有趣，它们会选择漂浮在水面的草丛或水里的隐蔽场所，吐出气泡筑巢生儿育女。而看护幼鱼的任务是由雄鱼来完成的。构筑泡巢的方法是将空气在口中吐成许多小泡再粘起来，使之不易破裂。再用粘结的小泡联成一个相当精致的巢。因此，这类能吐泡筑巢的热带鱼也被称为泡巢型鱼类。

攀鲈科是最常见的热带鱼类，它们的饲养繁殖都较容易，极适合初学者饲



苏门答腊红斗鱼深红的体表上镶嵌着几颗蓝点。

养。

斗鱼类中除了部分泡巢型品种外，还有一些称为口孵型种类的斗鱼，它们的特点是可以口中孵化后代。

口孵型斗鱼的繁殖方式是雄鱼将雌鱼排出的受精卵含在口中，一直看护到幼鱼孵化出来为止。

若饲养这些种类的鱼，我们就可以观察到水族箱中这些鱼有趣的繁殖过程了。



饲养紫鳍黑臀的人都会被它那瞬间的美丽所倾倒。

P O I N T

买鱼时应成对购买

若想欣赏攀鲈科热带鱼的美丽身姿和它们的繁殖习性，必须购买雌雄成对的饲养才行。应在那些能准确分辨出雌雄性别的水族店购买才更有把握。

泰国彩雀(暹罗斗鱼、蓝裙斗鱼)*Betta splendens*

这是一种常见的暹罗斗鱼，常装在小玻璃瓶里在水族店出售。该品种是野生暹罗斗鱼经改良繁育成的长鳍型斗鱼，强悍好斗，应避免将两尾以上雄鱼饲养在一起。

分布	泰国	身长	7cm
水质	弱酸性~中性	水温	18~28℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**苏门答腊红斗鱼***Betta coccinea*

为野生小型红斗鱼品种之一，素有文斗鱼的美称(说它文并非绝不打架)。性情虽显得文质彬彬，但和其它品种的鱼却往往处不来，最好别把它和别的鱼混养在一起。

分布	苏门答腊	身长	6cm
水质	弱酸性	水温	23~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**苏门答腊斗鱼***Betta fusca*

这种鱼体形比一般斗鱼略大，体色偏白，鳞上有淡蓝斑点。饲养较简单，但雄鱼的争夺领地意识很强，几尾雄鱼在一块就要打斗不休。

分布	苏门答腊	身长	10cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~30℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**加里曼丹斗鱼***Betta taeniata*

这种鱼因进口数量稀少，平常不易见到，但体态十分美观，知名度也相当高。尾鳍边缘呈艳丽的蓝色，下颌部位也像涂上一层蓝色似的。饲养较简单，对水质的要求也不高。

分布	加里曼丹西北部	身长	7cm
水质	弱酸性~中性	水温	3~28℃
饲养难易程度	容易	一般	难





黄纹黑鲷

Parosphromenus deissneri

此类鱼通称黑鲷，若以黑鲷为名售卖的鱼一般即是指这个品种。这类鱼性情都很温和，可与其他鱼混养。但同种鱼养在一起时展现的色彩更美。

分布	苏门答腊、爪哇、马来半岛	身长	4cm
水质	弱酸性	水温	25~28℃
饲养难易程度	容易	一般	难



花鳍黑鲷

Parosphromenus nagi

本品种是绿系黑鲷的代表性品种，饲养方式与其他黑鲷相同，应尽量饲养于新鲜的弱酸性水质中。

分布	马来半岛	身长	4cm
水质	弱酸性	水温	25~28℃
饲养难易程度	容易	一般	难



紫鳍黑鲷

Parosphromenus paludicola

这种鱼与其他品种的黑鲷有所不同，因背鳍较宽，极容易区分。体色特征为整个鱼鳍呈紫红色，仅边缘有一道淡绿色花边。

分布	马来半岛	身长	4.5cm
水质	弱酸性	水温	25~28℃
饲养难易程度	容易	一般	难



黑斑花鲷

Malplutta kretseri

本品种生活在斯里兰卡，是罕见的单种热带鱼。雄鱼成熟后背鳍及尾鳍均展得很开，呈绿色，体态十分匀称。饲养管理较简单，可与其他小型鱼类混养。

分布	斯里兰卡	身长	6cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~28℃
饲养难易程度	容易	一般	难



丽丽鱼（桃核鱼）

Colisa lalia

桃核鱼是最普通且知名度非常高的热带鱼。这种鱼适应性强，极易饲养，性情也较温和，因而极适合混养。繁殖也较容易。

分布	印度、孟加拉	身长	5cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~28℃
饲养难易程度	容易	一般	难



蓝彩丽丽

Colisa lalia var.

本品种属丽丽鱼的改良品种。体表蓝色比原生种多，色彩也更强烈。从国外进口后短期内适应性比原生种稍差，但适应后则不难养。

分布	改良品种	身长	5cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~28℃
饲养难易程度	容易	一般	难



霞彩丽丽

Colisa lalia var.

本品种也是丽丽鱼的改良品种之一，与蓝彩丽丽相反，体表蓝色部分去除后突出了橙色部分。这种鱼适应性强，易饲养，属极具魅力的热带鱼品种。

分布	改良品种	身长	5cm
水质	弱酸性~中性	水温	5~28℃
饲养难易程度	容易	一般	难



红丽丽鱼

Colisa labiosa var.

这种鱼与霞彩丽丽极相似，属体形比原生种略大的宽唇丽丽鱼的变种，但原生种进口量极少。

分布	改良品种	身长	6cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~28℃
饲养难易程度	容易	一般	难



三星曼龙鱼

Trichogaster trichopterus

因体侧长有两个圆斑，若把眼眶也算做一个圆斑，即得出此名。饲养、繁殖均较简单。繁殖时雄鱼负责做泡巢并看护到孵出幼鱼，属典型的泡巢型热带鱼。

分布	东南亚	身长	10cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~29℃
饲养难易程度	容易	一般	难



金曼龙鱼

Trichogaster trichopterus var.

此鱼为三星曼龙经黄化改良后定型下来的品种。体色呈鲜亮的橙黄色，知名度极高，适应性强，初学者极易饲养，繁殖也容易。

分布	改良品种	身长	10cm
水质	弱碱性~中性	水温	25~29℃
饲养难易程度	容易	一般	难



珍珠曼龙鱼

Trichogaster leeri

形如其名，遍体似嵌满珍珠，形状极美，在曼龙鱼家族中属出类拔萃的品种之一。发情期雄鱼从下颚至腹部都呈现鲜明的橙黄色，十分好看。

分布	马来半岛、苏门答腊、加里曼丹	身长	12cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~29℃
饲养难易程度	容易	一般	难



白曼龙鱼

Trichogaster microlepis

别名月光曼龙，全身闪烁着银灰色的光泽，充满梦幻般的气质。因其鳞片较小，极易脱落，在运输时应特别小心。

分布	泰国、柬埔寨	身长	14cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~29℃
饲养难易程度	容易	一般	难

迷你马甲鱼

Trichopsis pumilus

该鱼浑身镶满宝石似的漂亮斑点。适应性强，易饲养，性情温和，极适宜与其他小型鱼类混养。此鱼还能发出叫声著称。属超小型曼龙鱼品种，饲养历史极悠久。

分布	泰国、马来西亚、柬埔寨
身长	3cm
水质	弱酸性~中性
水温	25~28℃
饲养难易程度	容易 一般 难



发声马甲鱼

Trichopsis vittatus

该鱼属马甲鱼类中体形最大的一种，存在多种体色变异。雄鱼在争夺地盘的争斗中，嘴里能发出叫声，因此十分有名。饲养、繁殖较容易，喜欢在水草丛里制作泡巢。

分布	泰国、马来亚、印度尼西亚
身长	6cm
水质	弱酸性~中性
水温	25~29℃
饲养难易程度	容易 一般 难



安氏鲈


Ctenopoma ansorgii

此鱼是非洲产攀鲈科品种之一，通常呈红褐色，情绪激动时体表能现出黑纹。饲养时应在水族箱中多放置沉木或水草，为它们多留几处争斗的缓冲空间。

分布	中非（扎伊尔）
身长	6cm
水质	弱酸性~中性
水温	25~28℃
饲养难易程度	容易 一般 难



拉丁美洲地区



热带鱼最大的产地当数拉丁美洲。其中最主要的产地是全长6200公里，流经7个国家，流域面积为世界第一的亚马孙河。由于该地区拥有广阔的热带雨林和充沛的水量，给为数众多的热带鱼提供了良好的生息环境，像宝莲灯鱼、神仙鱼等许多久已闻名于世的热带鱼都是在那里来到我们水族箱的。

丽鱼科

神仙鱼

Pterophyllum scarale

即使从未饲养过热带鱼的人大概也听说过这个名字。神仙鱼可以说是热带鱼的代表性品种。现在无论是当地捕获的野生种类，还是经人工繁育改良的品种，许多商店都能买到。



双线彩鲷

Apistogramma bitaeniata

广泛分布于亚马孙河流域，背鳍和尾鳍张得很开，体色艳丽。因产地不同，各群体体形存在某些差异。



单线彩鲷

Apistogramma trifasciata

该鱼属小型凤凰鲷的一种，其伸展的背鳍和金属般的蓝色极具魅力。由于当地捕捉到的野生品种大量进口，因而价格相对便宜，很受养鱼爱好者的欢迎。



Cichlids

丽鱼科

神仙鱼、七彩神仙鱼这些响亮的名字，几乎可以作为热带鱼的代名词，这些鱼都属于丽鱼科。因此，从初学者看来，可以说这些鱼最具热带鱼的风采。

丽鱼科鱼类简直是一群各具特色的天才艺术家。

丽鱼科鱼类广泛分布于非洲和拉丁美洲各地，而且各种类都具有独特的形态和生活习性，是一个极受热带鱼爱好者喜爱的种群。

比如，体长5厘米左右的彩鲷类热带鱼都拥有宝石般美丽的体色，因此不少迷恋此道的人专门饲养这类鱼，可以说这个种群中不少都称得上热带鱼的代表性品种。

在拉丁美洲，生息着许许多多极具魅力和生机的丽鱼科鱼类，这些鱼尤其在欧洲最受欢迎。此外，近年在非洲也相继发现了许多拥有独特金属蓝外表的丽鱼科种



鼎鼎大名的神仙鱼就是丽鱼科的一个种类。

类。

丽鱼科鱼类的养育方式也十分有趣，这也是许多人喜欢饲养的原因之一。不少丽鱼科鱼喜欢成对生活，共同精心看护它们产下的卵和幼鱼。七彩神仙鱼从体表分泌出一种乳状分泌物喂养幼鱼，口孵鱼类还能把卵含在口中细心加以孵化，这些独特的生态方式都引起人们强烈的兴趣。



这种方式称为夸示求爱，欲以展现自己的美来俘获芳心。

P O I N T

有趣的育子方式

大多数丽鱼科鱼类不是产下卵就不管，而是继续耐心地看护它们，直到孵化出来后再领着它们一起游动。看到这些情景，饲养者也能感到其乐融融。

单线彩鲷(太妃)

Apistogramma agassizii

为彩鲷类的代表性品种,因广泛分布于亚马孙流域,有许多地域性变种,其中有些体态十分漂亮,极受热带鱼爱好者推崇。饲养起来比较容易。

分布	亚马孙河流域	身长	8cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



双线彩鲷

Apistogramma bitaeniata

这种鱼被公认为最美的彩鲷品种之一,是一种较常见,也很知名的品种。在亚马孙流域分布广泛,地域性变种也较多,极具饲养价值,饲养繁殖都很简单。

分布	亚马孙河流域	身长	8cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



花尾彩鲷

Apistogramma cacatuoides

这是常见的彩鲷类热带鱼品种之一,饲养历史悠久,很早即具知名度。与其他同类鱼种一样,地域性变种较多,饲养者除可根据自己的喜好选择品种外,还可以自己培育新的改良品种。饲养、繁殖均较简单。

分布	哥伦比亚、秘鲁	身长	8cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



蓝鳍彩鲷

Apistogramma trifasciata

是一种知名度较高的彩鲷类热带鱼,每年自南美批量进口,由于地域性变种很多,同种进口鱼中可分数种类型。售价不高,饲养繁殖较简单。

分布	巴拉圭水域	身长	6cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难





红蝶彩鲷

Apistogramma pertensis

每年有大量该种鱼混杂于其他彩鲷类幼鱼中从南美直接进口。销售时多称混种凤凰鲷。但不知何故，进口鱼中雌鱼极为罕见，绝大多数是雄鱼。

分布	亚马孙河	身长	7cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



琴尾彩鲷

Apistogramma sp. "rot-keil"

与前图介绍的红蝶彩鲷仅在尾部呈琴尾状上有所区别。原先仅靠德国供应，但目前可直接从产地进口，已较容易买到。

分布	巴西内格罗河	身长	8cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



棋盘鲷

Dicrossus filamentosus

因体侧的四方形斑纹图案而得名，琴形尾鳍与漂亮的身体十分协调，因此评价极高。每年旺季时大批自南美进口。

分布	亚马孙河、巴西内格罗河	身长	8cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



七彩凤凰

Papiliochromis ramirezi

是一种饲养历史极久的丽鱼科热带鱼的代表性品种。每年从东南亚及欧洲进口大量的人工繁育品种。适应性强，性格较温和，且不挑食，极适宜初学者饲养。

分布	哥伦比亚	身长	6cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



神仙鱼

Pterophyllum scalare

这种鱼为最常见的热带鱼品种之一。人气历久不衰，是热带鱼中的超级明星。改良品种较多，人工繁殖品种售价也较便宜。但选购时应注意观察进口过程中鱼的状态。

分布	亚马孙河	身长	12cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



埃及神仙鱼

Pterophyllum leopoldi

这种鱼原来进口数量稀少，最近已开始少量从产地进口。此鱼吻部稍显突起，体色中蓝色也更强些，与普通神仙鱼相比，形态有所差异。

分布	亚马孙河	身长	12cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



皇冠绿七彩神仙鱼

Symphysodon aequifasciatus aequifasciatus

七彩神仙鱼素有热带鱼之王的别称，目前原产地野生采集品种已有进口，令广大热带鱼爱好者大饱眼福。这种鱼要饲养好，需要相当的经验。

分布	亚马孙河	身长	16cm
水质	弱酸性~中性	水温	27~30℃
饲养难易程度	容易	一般	难



淡紫蓝七彩神仙鱼

Symphysodon aequifasciatus var.

这也是享有热带鱼之王美称的一个品种，以高档热带鱼著称。七彩神仙鱼现已有各种人工繁育品种问世，本品种即是其中之一。

分布	亚马孙河	身长	16cm
水质	弱酸性~中性	水温	27~30℃
饲养难易程度	容易	一般	难

这种鱼极具南美七彩凤凰鱼的情调，却是产自非洲的彩鲷类丽鱼品种之一。如饲养状态好，可变得非常美丽。全身散布着蓝色斑点，极具魅力。

分布	塞拉利昂
身长	7cm
水质	弱酸性~中性
水温	25~27℃
饲养难易程度	容易 一般 难



黑鳍鲷

Anomalochromis thomasi

俗称阿里鱼，是一种久负盛名的非洲丽鱼品种。经长期人工饲养及杂交，现存的纯种鱼已十分稀少，但这种鱼特有的令人目眩的深蓝体色依然流传下来，实在是一种不可多得的名贵鱼品。

分布	马拉维湖
身长	15cm
水质	中性~弱碱性
水温	25~27℃
饲养难易程度	容易 一般 难



马拉维蓝鲷

Sciaenochromis fryeri

非洲马拉维产的丽鱼多以蓝色著称，但看到这种遍体金黄的黄帝鱼，才知道原来竟有如此美丽的黄色丽鱼品种。此类鱼也因地域因素产生不少变种，图中这种鱼进口数量较多，享有很高知名度。

分布	马拉维湖
身长	12cm
水质	中性~弱碱性
水温	25~27℃
饲养难易程度	容易 一般 难



黄帝鱼

Aulonocara baenschi

SOUTHEAST ASIA 东南亚地区



东南亚是距日本最近的热带鱼产地，这片土地上的热带雨林中布满了众多的河流和湖泊，是盛产充满离奇魅力的各种热带鱼的宝库。这里的河湖中不但到处都能看见鲛鱼和鲃鱼类的踪影，就连不起眼的一片小河沟里也能找到斗鱼、马甲鱼等攀鲈科热带鱼，这正是这个地区的最大特色之一。这里还经常发现热带鱼新品种，是养鱼爱好者时刻关注的地区。

鲤科

绿彩灯鱼

Microrasbora sp

绿彩灯鱼是一种新近发现的热带鱼品种，初看身体只有一种绿色，但随着光照角度的变化，背部可显现出蓝色亮光，是一种极漂亮的热带鱼品种。



断线蓝铅笔鱼

Chela dadyburjori

这是一种非常美丽而富有魅力的铅笔鱼，因进口数量稀少，见到时应多买几条，成群饲养更显现美观。



蓝三角鱼

Rasbora heteromorpha

蓝三角鱼属最著名和名贵的鲤科鱼类之一，饲养历史相当悠久，和其他鲤科热带鱼一样，饲养状况越好，体色越鲜艳。





Carp & Loach

鲤科及美鲈科

热带鱼中鲤科鱼类的地位不亚于脂鲤科，尤其在东南亚一带分布十分广泛。由于这类鱼要养出漂亮的体色比养脂鲤科鱼类更需要经验和技巧，因而更受热带鱼爱好者的喜爱。

体质强壮、性格活泼，具有惊人的美丽外表。



不论是从热带鱼还是从观赏鱼的角度看，人们最熟悉的还是鲤科鱼类。凡是喜欢小动物和鱼的人，大概都曾有过饲养金鱼或锦鲤的经历吧。这些就都属于鲤科鱼类。

在饲养热带鱼的人里，也有不少并非一开始就养热带鱼，而是先从饲养金鱼等鲤科鱼类入门学起的。

在所有热带鱼中，不少鲤科鱼类像斑马鱼、虎皮鱼及鲃鱼类等品种，在日本人工饲养的历史都算比较悠久。

道理其实非常简单，鲤科热带鱼的主要产地是东南亚，地理上的方便条件有很大影响。正由于距离近，鱼的运输成本也



这么漂亮的体色只有蓝背鲃才能拥有。

相对较低，导致鱼的售价也比较便宜。

便宜也许往往被人不太珍惜，但是凡养过鱼的人都知道，鲤科鱼类决不会让你感觉乏味。

这些鱼大多适应性强，极易饲养，同时性情活泼，好动善泳，令人百看不厌。而且饲养时间长了，体色还会变得非常漂亮，美得甚至让你难以置信。



鲤科热带鱼中最常见的是玫瑰鲫。

P O I N T

内行人更喜欢饲养 鲤科热带鱼

正因为鲤科热带鱼比灯类品种更不容易养得漂亮，而且极易发色不正，这反倒成了吸引不少爱好者竞相饲养的理由，这些鱼养起来更见功夫。

蓝三角鱼*Rasbora heteromorpha*

这是鲤科鱼类中最常见的一种,属较普通的热带鱼。由于对水质要求不高,不娇贵、易饲养,因而人工饲养历史悠久。虽身价不高,但美丽的体形足以让人爱不释手。

分布	马来半岛	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**红蓝三角鱼(金三角灯)***Rasbora espei*

原来被认为与蓝三角鱼同种,但现在冠以相同名称的鱼已有数种,若养于弱酸性水质中,可展现体色中独有的深红色。

分布	泰国、马来西亚、印尼	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**彩线鲫(珍珠灯)***Rasbora urophthalmoides*

与下图的大点鲫同为较常见的鲤科品种,体侧的黑线可随着光线变化而发出绿光,十分漂亮。因体形极小,在混养及喂食时应特别小心。

分布	柬埔寨、泰国	身长	2cm
水质	弱酸性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**大点鲫(迷你红)***Boraras maculata*

这也是体形很小的鱼,成鱼体长仅2厘米左右,熟悉环境后极善游动,加上体色独特,十分引人注目。饲养时间长了以后容易饲养,但应及时喂食。

分布	马来半岛、苏门答腊	身长	2cm
水质	弱酸性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难





粗纹大点鲫

Boraras merah

这是与前图介绍的大点鲫极相似的一个彩鲫种类，但体侧的黑点部分稍显扁长，可加以区别。

分布	加里曼丹	身长	2cm
水质	弱酸性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



粗纹彩线鲫

Boraras brigittae

与前面介绍的彩线鲫非常相似，但全身的红色更明显。尾鳍边缘及体侧黑线附近的红色也更突出，可以此区分。

分布	加里曼丹	身长	2cm
水质	弱酸性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



蓝脊鲃鱼

Rasbora axelrodi

这种鱼是绿背鲃的地域性变种之一，体色十分美丽，极受欢迎。普通的鲃鱼仅在水质适宜时才可发出亮色，而这种鱼的发色不受水质条件限制。

分布	印尼	身长	2cm
水质	弱酸性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



钻石红莲灯

Rasbora axelrodi

长期以来只能在插图里见到，但最近已开始批量进口。这种鱼喜弱酸性水质，如环境条件适宜能发出美丽的绿光。最好饲养于含单宁酸较多的水中。

分布	印尼	身长	2cm
水质	弱酸性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

黑斑红鲃*Rasbora kalochroma*

这种鱼体色深红，并带极具特征的数个黑点。这种鱼适应性较强，如果运输过程中措施不当，买来后也可能很快死亡。现在不少鱼都能发出亮色。

分布	马来西亚、印尼	身长	10cm
水质	弱酸性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**红线鲫(一线长红灯)***Rasbora pauciperforata*

这种鱼从嘴尖到尾根部有一根红线，体色十分美丽。与脂鲤科粉红玻璃鱼的体色搭配相似。若水质条件合适，红线部分的颜色会变得更深，显得更漂亮。

分布	马来西亚、苏门答腊	身长	5cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**微型蓝灯鲃***Microrasbora sp.*

这种鱼在幽绿色金属光泽中透出一丝蓝色，十分美丽，属微型鱼类。近年才见诸介绍，喜弱酸性水质。

分布	泰国	身长	3cm
水质	弱酸性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**咖啡鱼***Puntius pentazona rhomboocellata*

这种鱼属皇冠鲫鱼的一个亚种，基本上也可认为是同一种鱼。这种鱼的特征是体侧的黑斑呈面包圈状，在养鱼爱好者中十分知名。

分布	加里曼丹	身长	5cm
水质	弱酸性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难





虎皮鱼

Puntius tetrazona

这是一种饲养历史较久的热带鱼。体色鲜明，游动敏捷，因而极受欢迎。这种鱼爱咬其它鱼的长鳍。不过近年来攻击性已没有原先强烈。

分布	苏门答腊、加里曼丹	身长	6cm
水质	弱酸性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



玫瑰鲫

Puntius conchonius

这是一种较普通的花鲫类热带鱼。进口数量稳定。这种鱼体色十分鲜艳，喜欢在水族箱里不停地游动，令人百看不厌。还有高鳍型的改良品种。饲养管理较简单。

分布	印度	身长	5cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



黄金条鱼

Puntius semifasciatus var.

这种鱼体表呈明快的黄色，散布着不规则黑斑。属一种较常见的花鲫类品种。饲养历史也较长。据认为是很早以前由人工改良成的品种，野生种已灭绝。

分布	改良品种	身长	5cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



红玫瑰鱼

Puntius titteya

这是一种饲养历史很久的小型花鲫类品种。体态很美，人见人爱。此鱼不挑饵料，性情温和，可与其他鱼混养。

分布	斯里兰卡	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

棋盘鲃*Oreichthys coasuatis*

水族店里多称为高鳍花鲃，属小型鲃类鱼种，背鳍挺直，十分显眼，体表的黑纹也很好看，外观极像棋盘鲫。

分布	印度	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**帆鳍鲃**

学名不详

这是一种背鳍形状独特的进口鲃类鱼种，背鳍极像玫瑰扯旗鱼。体形看似笨拙，但游动速度极快，用抄网捞取时应防止挂伤。

分布	印度	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**两头红***Sawbwa resplendens*

此鱼的美丽在同科热带鱼中数一数二。但要饲养好，让体色完全显现出来不大容易。此鱼性情温和，可与其他习性相同的小型鱼混养。群游时更显美丽。

分布	缅甸	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**彩虹鲃***Barbus jac*

这种鱼很久以来只有在国外的书本上才能看到，对广大热带鱼爱好者来说几乎可望而不可得。但目前已成批从国外进口，不少鱼进口时状况并不好，鱼体过瘦。

分布	缅甸	身长	4cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难





斑马鱼

Brachydanio rerio

这是一种饲养历史最悠久的热带鱼，既好养又便宜，极适合初学者饲养。这种鱼成群游动时更显欢快，令饲养者乐此不疲。

分布	印度	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



豹皮斑马

Brachydanio sp.

据考证此鱼是经改良后延续下来的品种，具体由来待考。但这种鱼极常见，饲养历史也久，和斑马鱼一样属最廉价的热带鱼之一。

分布	不明	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



断线蓝铅笔

Chela dadyburjory

虽然属斧胸齿鲤类，但与同类其他品种相比，并没有太多斧胸齿鲤的特点，体色因产地不同而有微小差异。因进口数量较少，不易买到。

分布	印度、缅甸	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



金丝灯

Tanichthys albonubes

这种鱼属常见观赏鱼品种之一，近来除水族店外，也可见装于玻璃瓶内销售的。饲养、繁殖都较简单，适宜初学者饲养。因价格不高往往不太被看重，其实这是一种很漂亮的热带鱼。

分布	中国	身长	4cm
水质	弱酸性~中性	水温	15~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

红尾鲨

Epalzeorhynchus bicolor

这种鱼身体上红黑两色分明，反差十分明显，极受欢迎。但争夺领地的意识极强，性情凶猛，不宜与其他鱼混养。尤以同类及近亲品种之间的争斗最为激烈。但适应性强，极易饲养。

分布	泰国	身长	15cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



银鲨

Balantiocheilus melanopterus

体大剽悍，体色呈耀眼的银灰色，极具知名度。很早以前就从国外大量进口。鱼苗进口时虽身长仅5厘米左右，但成鱼体形却相当大，饲养前对此应有充分准备。

分布	泰国、印尼	身长	30cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



三间鼠鱼

Botia macracantha

该鱼也许因体色鲜丽，知名度极高，很早就从国外大量进口，在同类品种中进口数量最多，常在水族店里见到。幼鱼容易感染白点病，饲养时应多加注意。

分布	印尼	身长	30cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



蛇仔鱼

Pangio kuhlii

同类鱼中有数个品种，但因不易区分，常一律被称为蛇仔鱼。此鱼极具饲养价值，但喜欢潜入底砂里很难露面。

分布	东南亚	身长	9cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



AUSTRALIA 大洋洲地区



澳大利亚是一个对野生动物出入境管理十分严格的国家。对热带鱼的管理也同样严格，仅允许少数人工繁育的品种进出口，今后盼望能有更多的鱼种能从澳大利亚来到我们国家。但目前可以买到的彩虹鱼族中就不乏非常美丽且容易饲养的品种。下面介绍几种澳大利亚独特的热带鱼品种。

彩虹鱼族

新几内亚彩虹鱼

Iriatherina werner

雄鱼的背鳍、腹鳍和尾鳍基部都伸得很长，独特的体形极为罕见，雄鱼间的争斗十分壮观。



红鳍蓝彩虹鱼

Melanotaenia praecox

闪烁着蓝光的鳞片及红色的鱼鳍非常美丽，是著名的彩虹鱼品种之一，这种鱼的售价近来已有所降低，适宜成群饲养。



蝴蝶鱼

Pseudomugil gertrudae

正如其名一样，雄鱼的背鳍及腹鳍能像蝴蝶翅膀一样张得很大，这种鱼的性格十分温顺，应选择不会伤害它的品种混养。

非洲地区



提起非洲，许多人就会想起热带草原的狮子和长颈鹿等哺乳类动物。实际上东非的大湖世界闻名，西非丛林里也有不少河湖。那里同样是盛产美丽热带鱼的宝库。非洲热带鱼中色彩鲜艳的品种不少，在普通水族店里也经常能看见它们灿烂夺目的身影。

花鲳科

火麒麟

Nothobranchius rachovii

这种鱼饲养历史极为悠久，据称是最难饲养的热带鱼品种之一。但近来饲养难度已经降低，成为一种较为普通的种类。



蓝眼灯鱼

Aplocheilichthys normani

这种鱼的特征正如其名，双眼像小灯笼似的闪烁着蓝光，十分美丽。性情极其温和，是布置水族箱不可缺少的品种。



坦噶尼喀灯眼鱼

Aplocheilichthys pumilus

这是一种生活在坦噶尼喀湖及附近水域中的灯眼鱼，样子比非洲蓝眼灯鱼更显华丽，极适宜十数尾以上群养。

STAGE 1

花鳉科

花鳉科热带鱼可分为卵胎生和卵生两大类。这种鱼在日本已有很长的饲养历史，至今每年仍不断有新的品种被发现，很受人们的欢迎。

素有活宝石之称，在美丽程度上一点儿不亚于宝石。



花鳉科热带鱼是日本人十分熟悉的热带鱼品种。这种鱼在日本甚至在普通的小河里都能找到。因此，儿时玩过这种鱼的人一定不少。

花鳉科鱼类作为观赏鱼的历史也很悠久，像孔雀鱼和月光鱼等价格便宜又容易饲养的品种，无论在哪家水族店都有销售。不少人饲养热带鱼就是从饲养花鳉科品种开始的。

这些鱼容易繁殖，不用怎么精心照管就能亲眼目睹大鱼生小鱼的有趣场面。新生命的诞生过程是激动人心的，能在咫尺之遥观看到这种情景，也是吸引许多初学养鱼者选择花鳉科鱼类的原因之一。



火麒麟。

这类鱼不但价格低廉、容易饲养，其中也不乏极美丽的品种。如主要分布于非洲的许多卵胎生花鳉科鱼类就有活宝石的盛名。

人们所熟悉的孔雀鱼也在不断繁衍出非常漂亮的品种，其美丽令人拍案叫绝，许多热带鱼爱好者为之倾倒。



卵胎生花鳉类中最常见的品种是孔雀鱼。

P O I N T

观看新生命的诞生过程

饲养胎生及卵胎生花鳉科热带鱼切不可错过它们产出幼鱼的场面。无论多么小的小生命，它的诞生过程都会十分感人。

进口孔雀鱼

Poecilia reticulata var

这类孔雀鱼是市面上最常见的，也是初学养鱼者普遍饲养的品种。主要由新加坡人工繁殖后大量进口。有些幼鱼是在盐分浓度较高的水中繁殖的，所以不少刚进口的幼鱼还不能适应日本的水质。然而，一旦适应了，以后饲养起来其实并不困难。这类孔雀鱼中的不少品种人们耳熟能详，选择自己喜欢的品种也是一种乐趣。它们的繁殖较容易，只要其他条件合适，想繁殖出多少都行。而且它们什么饵料都能吃，正如不少饲养者常说的：“好养的是孔雀，难养的也是孔雀”。这种鱼的确是一种最普通但饲养学问很深的品种。

即使从没养过孔雀鱼的人，起码也都

听说过它的名字。曾有一段时间流行过一种被称为“孔雀鱼艾滋病”的传染病，孔雀鱼十分不易养活。经过广大养鱼爱好者的不懈努力，这种情况已经有所好转。

分布	改良品种	身长	5cm
水质	弱碱性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



红尾孔雀



红斑蛇皮孔雀



黄斑蛇皮孔雀



蓝尾孔雀



黑尾孔雀

日本产孔雀鱼

Poecilia reticulata var

对于从国外进口，由日本国内繁殖出的孔雀鱼就称为日本产孔雀鱼。这种鱼主要是为满足广大热带鱼爱好者的需要而生产的。因此，本地鱼普遍比进口鱼品质要



红斑大花尾孔雀



红斑黄体孔雀



蓝尾蛇皮孔雀

高，体形也较美，售价当然也高得多。这正是日本产孔雀鱼普及推广中的一个难题。

日本产孔雀鱼的饲养、繁殖方法基本上和进口孔雀鱼差不多，但由于出生在日本的水质中，因此更强壮也更容易饲养。

这种鱼虽然大名鼎鼎，但任何水族店都能买到。光是饲养美丽的孔雀鱼就已经是一件令人愉快的事了。但饲养的最大的乐趣却在于对它进行的品种改良。培养出一种新品种给人带来的那份喜悦，是只有饲养者本人才能体会到的。请你也来试着繁殖一个自己独创的品种。

分布	改良品种	身长	5cm
水质	中性—弱碱性	水温	25—27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



蓝尾孔雀



黄尾孔雀



蓝孔雀



黄孔雀



蓝尾黄身孔雀



蓝斑大花尾孔雀



蓝尾白身孔雀



红月光鱼

Xiphophorus maculatus var.

月光鱼和孔雀鱼同为最常见的卵胎生花鳞科品种之一。这种鱼适应性强，容易饲养，不挑食，价格也相当便宜，极适宜初学者饲养。

分布	墨西哥	身长	5cm
水质	中性~弱碱性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



红剑尾鱼

Xiphophorus helleri var.

因雄鱼尾鳍像剑一样直而得名。在热带鱼中早就十分有名，且极受欢迎。其雌雄鱼间可以自由进行性变换的独特本领令人惊叹。适应性很强，饲养、繁殖都比较容易。

分布	墨西哥	身长	5cm
水质	中性~弱碱性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



帆鳍玛丽

Xiphophorus variatus var.

原种体色较暗淡，经过人们反复改良后培育出的品种体色非常美丽。左图这种高鳍品种最近已很常见。该品种适应性强，饲养、繁殖都比较容易。

分布	墨西哥	身长	6cm
水质	中性~弱碱性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



金黄帆鳍玛丽

Poecilia velifera var.

其特征正如其名，雄鱼的背鳍像帆状伸展开来，是一种极美丽的大型卵胎生花鳞科品种。除左图的金黄色以外，还有白金色和普通色等几个品种。

分布	墨西哥	身长	5cm
水质	中性~弱碱性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

尖嘴蝶鱼*Belonesox belizanus*

在花鲷科中属罕见的完全以小鱼为食的品种。可捕食其他花鲷科鱼类及孔雀鱼等。饲养不太困难，但切不可与其他小鱼混养。该品种的亲鱼可直接产出体型较大的幼鱼，但为避免幼鱼被亲鱼所吞食，应捞出后分开饲养。

分布	美洲中部	身长	20cm
水质	中性—弱碱性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**蓝眼灯鱼***Aplocheilichthys normani*

其特征如其名所示。眼部上方能闪耀出蓝色亮光，群游时显得十分美丽。饲养较简单，性情也比较温和，极适合饲养在以水草布景为主的混养水族箱里。

分布	尼日利亚	身长	3cm
水质	中性—弱碱性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**坦噶尼喀灯眼鱼***Aplocheilichthys pumilus*

眼部光泽虽不很突出，但金属蓝色的身体和金灿灿的鱼鳍十分美丽耀眼，是一种极可爱的小型卵生花鲷科品种。水质要求不高，对饵料也不挑剔，饲养繁殖都比较容易。

分布	坦噶尼喀湖	身长	3cm
水质	中性—弱碱性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**火麒麟***Nothobranchius rachovii*

因体色艳丽而极受欢迎，很早以来就具有很高的知名度。但饲养比较困难，最近已出现不少日本繁殖出的鱼种，比较容易饲养。

分布	莫桑比克	身长	5cm
水质	弱酸性—中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



Cat Fish

鲇科

STAGE

鲇科鱼类几乎遍布整个世界，属淡水鱼中数量较大的种属。从极具震撼力的大型鱼类到用作水族箱吉祥物的小型鲇科鱼类，品种多种多样。

种类虽多，鲇须是它们的共同特征。



分布于全世界的鲇科鱼类最大的特点是种类繁多，前面介绍的各科鱼类虽然也有许多种和变种，但它们在鲇科面前却只能是小巫见大巫。

鲇科鱼类据说有2000至2500个品种，几乎相当于目前已知淡水鱼类品种总数的一半。

如此庞大的种群当然不乏各种有趣的品种，比如能放电的鱼、反游的鱼、透明的鱼，还有3米多长的巨型鱼，十分丰富多彩。光凭大家看惯的日本鲇科鱼类，根本想象不出它们竟有那么多奇形怪状的同类。



鲇科里还有这样古怪的鱼。



豹斑鱼几乎成了水族箱里公认的吉祥物。

世界各国大都把鲇科鱼类作为重要的食用鱼加以利用。作为观赏鱼饲养的仅占极少的比例。即使这样，我们还能在水族店里看到那么多形状各异的身影。每个人饲养热带鱼的喜好各不相同，但在如此众多的鲇科鱼类面前，你总能挑选到喜欢的品种。

P O I N T

选一个水族箱的吉祥物

小型鲇科热带鱼中有许多好玩的鱼，种类十分繁多，很容易就能找出自己所喜欢的，那么你也为自己的水族箱选一个吉祥物吧。

帆鳍鲇*Glyptoperichthys gibbiceps*

这种鱼因长着巨大的背鳍而得名。每年从东南亚一带大量进口人工繁殖品种，许多水族店都有出售。大多用于水族箱除苔。该鱼生长很快，性情凶猛。

分布	巴西内格罗河	身长	50cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**斑条鲇***Hipocistrus zebura*

此品种为最具知名度的鬚形鲇科鱼类，发现及进口时间并不长，最初售价极高，现已有所回落。

分布	缅甸新固河	身长	8cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**虎鲇***Peckoltia vermiculata*

此鱼是很早就进口的鲇科鱼类之一。目前幼鱼，成鱼均有较大批量进口，价格便宜且相当知名。只要常找找看，也许就能买到图中那么漂亮的鱼了。

分布	缅甸新固河	身长	12cm
水质	中性	水温	5~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**黄鳍彩鲇***Baryancistrus sp.*

此鱼体色可与斑条鲇媲美，属最漂亮的一种鲇科鱼，极具知名度。因而大量进口。领地意识强，极具攻击性，适应性较弱。如保持水质干净，饲养应不成问题。

分布	缅甸新固河	身长	25cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难





耳斑鲇

Otocinclus vittatus

此鱼属于最普通的斑形鲇鱼。在水族店的同类中数量最大。与其他种类斑形鲇相比较易饲养，极适宜初学者。因喜食苔类，常被用于清除水族箱青苔。

分布	亚马孙河	身长	5cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



琴形鲇

Bunocephalus coracoideus

这种鱼因体态极似班卓琴而得名，属底栖性小型鲇科鱼类，常匍匐不动。不欢阳喜光，白天常潜入底砂中躲藏，性极胆小，注意别惊吓它。

分布	亚马孙河	身长	5cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



啼鲇

Amblydoras hancocki

这种鱼广泛分布于亚马孙流域，属极常见的发声鲇类鱼，很早以前就已从国外进口，如用网捞取时该鱼能用胸鳍与胸骨摩擦发出“叽-叽-”的声音。

分布	亚马孙河	身长	12cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



豹斑脂鲇

Pimelodus pictus

此鱼饲养历史较早，是小型鲇科鱼类之一，知名度颇高。该鱼性情活泼好动，总爱在水族箱中游个不停，适应性强，对饵料不挑剔，也能吞食小鱼。

分布	秘鲁、委内瑞拉	身长	12cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

帆鳍鲇*Glyptperichthys gibbiceps*

这种鱼因长着巨大的背鳍而得名。每年从东南亚一带大量进口人工繁殖品种，许多水族店都有出售。大多用于水族箱除苔。该鱼生长很快，性情凶猛。

分布	巴西内格罗河	身长	50cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**斑条鲇***Hipocistrus zebura*

此品种为最具知名度的鬃形鲇科鱼类，发现及进口时间并不长，最初售价极高，现已有所回落。

分布	缅甸新固河	身长	8cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**虎鲇***Peckoltia vermiculata*

此鱼是很早就进口的鲇科鱼类之一。目前幼鱼，成鱼均有较大批量进口，价格便宜且相当知名。只要常找找看，也许就能买到图中那么漂亮的鱼了。

分布	缅甸新固河	身长	12cm
水质	中性	水温	5~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**黄鳍彩鲇***Baryancistrus sp.*

此鱼体色可与斑条鲇媲美，属最漂亮的一种鲇科鱼，极具知名度。因而大量进口。领地意识强，极具攻击性，适应性较弱。如保持水质干净，饲养应不成问题。

分布	缅甸新固河	身长	25cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难





耳斑鲇

Otocinclus vittatus

此鱼属于最普通的斑形鲇鱼。在水族店的同类中数量最大。与其他种类斑形鲇相比较易饲养，极适宜初学者。因喜食苔类，常被用于清除水族箱青苔。

分布	亚马孙河	身长	5cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



琴形鲇

Bunocephalus coracoideus

这种鱼因体态极似班卓琴而得名。属底栖性小型鲇科鱼类。常匍匐不动。不欢阳喜光，白天常潜入底砂中躲藏。性极胆小。注意别惊吓它。

分布	亚马孙河	身长	5cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



啼鲇

Amblydoras hancocki

这种鱼广泛分布于亚马孙流域，属极常见的发声鲇类鱼。很早以前就已从国外进口。如用网捞取时该鱼能用胸鳍与胸骨摩擦发出“叽-叽-”的声音。

分布	亚马孙河	身长	12cm
水质	弱酸性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难



豹斑脂鲇

Pimelodus pictus

此鱼饲养历史较早，是小型鲇科鱼类之一。知名度颇高。该鱼性情活泼好动。总爱在水族箱中游个不停。适应性强。对饵料不挑剔。也能吞食小鱼。

分布	秘鲁、委内瑞拉	身长	12cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

玻璃鲇*Kryptopterus bicirrhus*

这是一种全身透明的小型鲇科鱼类，极其有名。此鱼属鲇科中少见的昼行性鱼类，常成群结队在中层水域游动。可与其他鱼混养。

分布	泰国	身长	8cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**吸石鱼***Pangasius sutchi*

此鱼是产自东南亚一带最常见的大型鲇科鱼类之一，好动，常游个不停。与东南亚的其他鲇科鱼类不同，吸石鱼性情极温和，可与其他鱼类混养。

分布	泰国	身长	60cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**反游猫鱼***Synodontis nigriventris*

这种鱼在非洲已发现数个品种，在腹部朝天游动的鲇科鱼类中，本种最为知名。在鲇鱼类中属小型鱼，性格老实，不论同类或其他种类均可混养，饲养极简单。

分布	刚果河	身长	8cm
水质	弱碱性~中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**花斑双须鲇***Synodontis multipunctatus*

此鱼为产自坦噶尼喀湖的鲇鱼品种，也是一种极漂亮的鲇科鱼类，喜欢游动，十分讨人喜欢。在原产地常成群活动，但在水族箱内同种间常发生小摩擦。

分布	坦噶尼喀湖	身长	15cm
水质	弱碱性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难





鸭嘴鲶

Sorubim lima

此鱼是常见大型鲶科鱼类之一。在饲养过程中能观察到它如何从弱不禁风的幼鱼，历经一次次蜕皮而长成庞然大物。这也是它所独具的魅力之一。此鱼性情温顺，极易饲养。

分布	亚马孙河
身长	50cm
水质	中性
水温	25—27℃
饲养难易程度	容易 一般 难



红尾鲶

Phractuscephalus hemiolepis

此鱼因为长相独特，体色艳丽，且不怕人而十分知名。属大型鲶科鱼类之一。幼鱼的生长速度极快，很难与其他鱼类相处，常主动发起攻击。

分布	亚马孙河
身长	100cm
水质	中性
水温	25—27℃
饲养难易程度	容易 一般 难



斑马鲶

Mesodonotus tigrinus

浑身布满黑白长条，是一种极美丽的观赏鲶类品种。属大型鲶类中的极品。10多年前开始进口日本，价格虽有所下降，但仍属高价品种之一。

分布	亚马孙河上游
身长	60cm
水质	弱酸性—中性
水温	25—28℃
饲养难易程度	容易 一般 难

虎鲶

Pseudoplatystoma fasciatum

此鱼属知名较早的大型鲶鱼类。该鱼适应性强，饲养较容易，但因胆子太小，受惊后易乱窜而撞上玻璃，饲养时应尽量少惊动它。成鱼体形较大，饲养前应有所准备。

分布	亚马孙河
身长	100cm
水质	中性
水温	25~27℃
饲养难易程度	容易 一般 难



银鲶

Brachyplatystoma vailanti

此鱼胸腹部较厚，属大型鲶科鱼类之一。长大后银白色体表中透出淡绿色光泽，十分美丽。性温和，适应性强，可与其他品种混养，但生长速度较缓慢。

分布	亚马孙河
身长	60cm
水质	弱碱性~中性
水温	25~27℃
饲养难易程度	容易 一般 难



扁嘴火箭鲶

Sorubimichtys planiceps

这种鱼苗条细长，也是一种大型鲶科鱼类。头部扁平呈饭铲状，进口数量虽不多，但较稳定，性情不算温和，但尚可与其它品种混养。

分布	亚马孙河上游
身长	100cm
水质	中性
水温	25~27℃
饲养难易程度	容易 一般 难



Ancient Fish & Big Fish

古代鱼及大型鱼

STAGE 8

严格地说，本节所介绍的鱼类许多种并不能称为热带鱼，但都是水生物种中十分重要的品种。如果你想饲养这些鱼，饲养前就应做好长期对它们负责的准备。

在它们动人的优雅身姿前，
你很难不为之所动。



热带鱼的魅力不仅限于色彩的艳丽，另一个吸引人之处在于它们丰富的类型和各种各样的外观形态上。

通常一提到热带鱼，人们往往就会想起那些色彩缤纷的小鱼，然而别忘了，许多神态威猛的大型鱼同样具有不可抗拒的魅力。

尤其是龙鱼，不但具有大型鱼类的所有魅力，同时也拥有无可比喻的美丽。因此，它的声誉如此之高就不难理解。这些大型鱼一般适应性都极强，容易饲养，也会和人熟悉并建立一定的情感，让人觉得和养猫养狗并没有什么差别。



牙龙鱼(雀鳢)是古代鱼中一种十分可爱的鱼。



在水族箱里就能看见它们自古不变的身姿。

其中有些品种可能长得过于庞大，并不适宜在家里饲养，要养它们需要准备非常大的水槽，但它们拥有的魅力的确也值得付出这一切。

必须说明的是，其中的亚洲龙鱼及巨骨舌鱼都是华盛顿公约规定的保护品种，连赤眼鲶鱼也是日本政府保护的珍稀宝贵动物，如果有幸能得到饲养这些贵重鱼种的机会，真希望饲养者能够想方设法养好它们。

P O I N T


饲养它们要有足够的耐心

大型鱼身体都很结实，饲养起来比较容易。惟一要注意的问题就是必须做好长期饲养它们的准备。这既是最重要的，也是最难做好的。

银龙鱼*Osteoglossum bicirrhosum*

这是一种最常见的龙鱼，生长速度极快，最终能长成长近1米的大鱼。饲养前必须有足够的准备。由于价格不高，往往不被看得那么珍贵。

分布	巴西、圭亚那	身长	100cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**亚洲金龙鱼***Scleropages formosus*

这种鱼带有红系色彩，因颜色深浅不同而有许多名称，其中最常见的一种名为血红龙的品种，饲养时注意多喂一些虾类等富含胡萝卜素的饵料。

分布	马来西亚、印尼	身长	60cm 以上
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**巨骨舌鱼***Arapaima gigas*

这是世界上体型最大的淡水鱼类之一，成鱼体长可超过2米。不太适合在家里饲养。其生长速度惊人，如不具备特别巨大的水槽，别轻易饲养它的念头。

分布	亚马孙河	身长	250cm
水质	中性	水温	25~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

**尖嘴鳄(尖嘴雀鳊)***Lepisosteus oculatus*

这是一种饲养历史悠久的雀鳊科鱼类，至今仍是常见的雀鳊科鱼类之一。此鱼适应性强，饲养容易，在雀鳊科鱼类中体型并不算大，适合饲养。

分布	得克萨斯、佛罗里达	身长	50cm
水质	中性	水温	29~27℃
饲养难易程度	容易	一般	难

